

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума (далее АЧС) свиней это высокозаразная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС-вирус, который очень устойчив во внешней среде и может сохраняться до 100 дней в почве.

К АЧС восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Инфекция может передаваться от больных животных через корма, пастбища, транспортные средства, помещения и инвентарь, загрязненные выделениями больных животных. Распространению вируса способствует использование в качестве корма свиньям не обезвреженных проваркой пищевых отходов. Механическими переносчиками вируса становятся птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей, мухи, вши и блохи), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями. Это острое вирусное заболевание характеризуется резким повышением температуры тела до 41-42 градусов, учащением пульса и дыхания. Через два-три дня температура снижается, и в течение нескольких дней животное погибает.

Наиболее характерные признаки: посинение кожи ушей, живота и боков туловища, мелкие кровоизлияния на коже, удушье, рвота и парез задней части тела. Особенность и опасность болезни в том, что она неизлечима, меры специфической профилактики (вакцинации) не разработаны. Поэтому остаются только профилактические меры, основанные на строгом выполнении предприятиями, хозяйствами и гражданами ветеринарных правил.

Для предотвращения заноса заболевания необходимо:

- своевременно регистрировать поголовье свиней в похозяйственных книгах;

- обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, вакцинации и других ветеринарных обработок;

- содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта с другими животными;

- регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные, использовать сменную обувь и одежду, отдельный инвентарь для ухода за свиньями;

- исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без термической обработки, покупать корма только промышленного производства или подвергать их проварке в течение трех часов;

- не допускать посещения хозяйств посторонними лицами;

- не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов;

- не проводить подворный забой свиней и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной

экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы.

В случае появления первых признаков заболевания свиней незамедлительно обратиться в государственную ветеринарную службу.

В случае возникновения АЧС все поголовье свиней в очаге заболевания поголовно ликвидируют бескровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Зола закапывают в ямы, смешивая ее с известью. Помещения и территорию ферм дезинфицируют.

На расстоянии 10 км. вокруг неблагополучного пункта все поголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы.

Карантин снимается через 6 месяцев с момента последнего падежа, разведение свиней разрешают не менее чем через год.