

Высокопатогенный грипп птиц

ВГП-высококонтрагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением кровеносной и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Характерными клиническими признаками ВГП являются снижение продуктивности, угнетенное состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покровов, отек межчелюстного пространства, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, нарушение координации движений, синусит, ринит, конъюнктивит, диарея. Возможно бессимптомное течение болезни у вакцинированных против ВГП птиц, а также у диких водоплавающих птиц. Характерными патологоанатомическими изменениями при ВГП являются кровоизлияния в подкожной клетчатке, слизистых и серозных оболочках, головном мозге, паренхиматозных органах, застойная гиперемия в органах и тканях.

Возбудитель сохраняется в нейтральной влажной среде и в замороженном состоянии, чувствителен к нагреванию, прямым солнечным лучам и действию дезинфицирующих средств.

Инкубационный период болезни составляет от 1 до 21 календарных дней. Источником возбудителя являются больные птицы, их секреты и экскреты. Резервуаром возбудителя в природе являются дикие водоплавающие птицы. Возможен аэрогенный путь передачи возбудителя. Факторами передачи возбудителя являются помет, корма, вода, инвентарь, одежда и обувь персонала, подстилка, транспортные средства и другие объекты.

Для предупреждения заражения гриппом птиц в ЛПХ необходимо проводить следующие мероприятия:

- не допускать выгул домашней птицы в местах обитания диких перелетных птиц;

- оборудовать навесы и ограждения из сетки в местах выгула и кормления домашней птицы;

- соблюдать чистоту в помещениях и выгульных дворах, где содержится домашняя птица, проводить регулярную очистку и дезинфекцию (для побелки использовать хлорную известь, для орошения полов - раствор белизны);

- оборудовать приспособления для обеззараживания обуви в виде ванночек или дезинфекционных ковриков;

- постоянно вести борьбу с грызунами, которые являются источником различных инфекционных заболеваний и могут быть переносчиками вируса гриппа птиц;

- употреблять в пищу хорошо проваренное или прожаренное мясо птицы, исключить потребление сырых яиц;

избегать приобретение живых птиц и птицеводческой продукции неизвестного происхождения, в местах неустановленной торговли, а также без ветеринарных сопроводительных документов.

При появлении первых признаков болезни у птиц незамедлительно проинформировать ветеринарную службу района.